

# توصیه های بهداشتی جهت زائرین محترم اربعین

- ۱- حداقل ۲ هفته قبل از عزیمت به کشور عراق **واکسن آنفلوآنزا** تزریق نمایید.
- ۲- در صورت داشتن بیماری یا مشکلات جسمی قبل از سفر به پزشک خود مراجعه نمائید.
- ۳- داروهای مصرفی روزانه و همچنین لیست داروهای مصرفی و دوز آنها را به همراه داشته باشید.
- ۴- از تماس نزدیک با افراد ناخوشی که سرفه، عطسه و تب دارند خودداری کنید (بیش از یک متر فاصله بگیرید).
- ۵- دستهای خود را به طور مرتب با آب و صابون بشوئید (**شستشوی مداوم دستها** به تنها ی ۵۰ درصد از انتقال بیماری های عفونی پیشگیری می نماید).
- ۶- ژل ضد عفونی دست همراه داشته باشید.
- ۷- از تماس دست آلوده به چشم و دهان خود بپرهیزید.
- ۸- از سجاده ، لیوان و بطربی آب شخصی خود استفاده نمایید.
- ۹- جهت نوشیدن آب حتماً از **آب معده بسته بندی شده** استفاده نمایید.
- ۱۰- جهت تامین غذا حتی الامکان به موکب های ایرانی و مراکز معتبر مراجعه نمائید.
- ۱۱- از مصرف سبزی خام، سالاد و یا غذاهای حاوی سبزی خام و سس های مختلف خودداری نمائید.
- ۱۲- از تماس ، دست دادن و رو بوسی با دیگر زائران حتی الامکان خودداری کنید.
- ۱۳- در هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان خود را با دستمال بگیرید و دستمال را در سطل آشغال بیاندازید و در صورت نبود دستمال از بالای آستین لباستان استفاده کنید.
- ۱۴- از مصرف شیر خام و سایر فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه جدا خودداری نمائید.
- ۱۵- از خریدن و مصرف نوشیدنی ها و مواد غذایی از دست فروشان پرهیز نمائید.
- ۱۶- در شلغوی جمعیت سعی کنید جلوی دهان و دماغ خود را با **ماسک** بپوشانید.
- ۱۷- در صورت بروز تب و علائم تنفسی بلا فاصله به پزشک کاروان مراجعه کنید.
- ۱۸- مایعات زیاد بنوشید و استراحت و خواب کافی داشته باشید.
- ۱۹- **بیماری وبا** را جدی بگیرید و در صورت بروز فوراً به پزشک مراجعه نمایید ( علائم شایع بیماری : اسهال آبکی شدید با دفعات اجابت مزاج غیرقابل شمارش و شبیه آب برنج و بدبو ، نبودن دل درد و دل پیچه برخلاف بسیاری از بیماریهای گوارشی ، گرفتگی عضلات پشت ساق پا ، عطش فراوان ، فقدان خون در مدفعه ، استفراغ بدون حالت تهوع ، احساس پری و غرغوشکم ، فقدان تب )
- ۲۰- هرگونه طغیان ناشی از آب و مواد غذایی را به پزشک یا کادر بهداشتی مستقر گزارش نمایید ( تعریف طغیان منتقله از آب و غذا : اگر دو نفر یا بیشتر از یک غذا یا آشامیدنی مشترک استفاده کرده و علائم بالینی مشترک داشته باشند )

**نکته مهم :** زائرین محترم در طول سفر یا بعد از بازگشت جهت تسکین احتمالی بیماری خود از مصرف خوسرانه دارو به ویژه کورتون ها (برای مثال آمپول دگزا متازون) به دلیل تضعیف سیستم ایمنی بدن و احتمال افزایش طول دوره بیماری، جدا خودداری نمایند.